Prevent & Protect
Platform for Infection Control

Infektionsschutz
Prä- und postoperativ

Zusammenfassung der KRINKO-Empfehlungen zur Prävention postoperativer Wundinfektionen (SSI)

	Gültigkeit für A / B		Empfehlung und Evidenzgrad
PRÄOPERATIV	Patienten / OP-Art A	Alle	Präoperative Infektionen bei Patienten erkennen und behandeln **IB**
		■ Patienten mit nasaler *S. aureus*-Kolonisation und kardiochirurgischer oder orthopädischer OP ■ Operationsarten mit einem hohen Anteil von *S. aureus* als Erreger von Wundinfektionen für *S. aureus*-Träger	Dekolonisation der Nase allein oder in Kombination mit einer antiseptischen Körperwaschung, **IB** alternativ eine Antiseptik der Nase und des Körpers **II**
		Alle	Präoperative Verweildauer so kurz wie möglich halten **II**
		Kolorektale OPs	Mechanische Darmentleerung und orale Antibiotikagabe **II**
		Alle	■ Gründliche Reinigung des OP-Hautareals **II** ■ Haare kürzen und nicht rasieren **IA** (Zeitpunkt unter arbeitsorganisatorischen Gesichtspunkten wählen) **II** ■ Indikation zu einer systemischen antibiotischen Prophylaxe eingriffsspezifisch stellen **IA**
	Personal B	Alle Personen, die die OP-Abteilung betreten wollen	**In der Personalumkleide** **Unreiner Bereich:** ■ Ablegen der Oberbekleidung und des Schmucks **II** ■ Achtung: kein Nagellack oder künstliche Fingernägel **IB** Hygienische Händedesinfektion **Reine Seite:** ■ Anlegen keimarmer Bereichskleidung **II**
		OP-Personal	**Vor Betreten des OP-Raums:** ■ Mund-Nasen- und Haar-Schutz anlegen, **IB** alle Bart- und Kopfhaare, sowie Mund und Nase müssen vollständig bedeckt sein **II** ■ Hygienische Händedesinfektion **IB** ■ Werden die Hände vor der chirurgischen Händedesinfektion gewaschen, sind sie zu trocknen **II** ■ Chirurgische Händedesinfektion mit einem alkoholbasierten Händedesinfektionsmittel (ohne Remanenzwirkstoffe) **IB** ■ Erneuerung des MNS vor jeder Operation und bei Durchfeuchtung, **II** mit anschließender hygienischer Händedesinfektion **IB** **Im OP-Raum:** ■ Sterilen OP-Kittel und sterile OP-Handschuhe anlegen **IB** ■ Bei OPs mit erwartbar vermehrten Läsionen: Zwei Paar Handschuhe anlegen **II**
POSTOPERATIV	Patienten / OP-Art A	Alle	■ Abdecken der Wunde mit einer sterilen Wundauflage und erster Verbandwechsel nach ca. 48 Stunden (sofern es keinen Anlass für einen früheren Wechsel gibt) **IB** ■ Verzicht auf erneute sterile Wundabdeckung bei trockener und verschlossener Wunde **IB** ■ Möglichst frühzeitige Entfernung von Drainagen **II** ■ Bei Verdachtsmomenten auf eine SSI: zeitnahe und dringliche Verifizierung mit entsprechenden sofortigen nachgelagerten Maßnahmen **IB** ■ Anwendung der *Basishygiene-Regeln* bei Verbandwechseln und Entfernen von Nahtmaterial und Drainagen **II** ■ *Patienten* darüber informieren, wie sie durch hygienebewusstes Handeln zur Heilung beitragen können **II**

Mehr Informationen zur professionellen Infektionsprävention, Best Practice aus dem Gesundheitswesen und wichtigen Erregern finden Sie auf **www.prevent-and-protect.de** – unserer Plattform für den Infektionsschutz.

People.Health.Care.
EIN SERVICE VON Lohmann & Rauscher